

# IMPÉTIGO



## ÉPIDÉMIOLOGIE



- Peu fréquent à rare contrairement à la folliculite bactérienne
- **Facteurs prédisposants :**
- **Impétigo juvénile** : mauvaises conditions d'hygiène au sein des élevages canins.
- **Impétigo du sujet adulte / âgé** : traumatismes (ex : chiens de chasse-ronces), immunodéficit, endocrinopathie (ex : Syndrome de Cushing).



## SIGNES CLINIQUES



### Topographie lésionnelle :

- **Impétigo juvénile** : Zones glabres notamment abdomen en région ventrale, chanfrein, région axillaire.
- **Impétigo du sujet adulte / âgé** : localisation variable selon étiologie (traumatique, maladie systémique)

### Sémiologie lésionnelle et signes cliniques :

#### Impétigo juvénile :

- Pustules
- Croûtes jaunâtres
- Absence de prurit / douleur

#### Impétigo du sujet adulte / âgé ou impétigo bulleux :

- Larges pustules
- Croûtes jaunâtres, érosions, collerettes épidermiques
- Prurit peu fréquent



## PATHOGÉNIE



- Pyodermité superficielle
- Infection bactérienne superficielle touchant l'épiderme
- Germe le plus fréquemment impliqué : *Staphylococcus pseudo-intermedius*
- **2 formes** : Impétigo juvénile du chiot et Impétigo du sujet adulte / âgé



## GRANDS AXES DIAGNOSTIQUES



- **Anamnèse, Commémoratifs**
- **Examen clinique**
- **Examen dermatologique**
- **Diagnostic différentiel** : pustulose stérile (pemphigus foliacée, pustulose sous cornée, ...) ou infectieuse (dermatophytie, démodécie, folliculite bactérienne)
- **Recherche de la cause sous-jacente**
- **Examen cytologique** : Permet de confirmer la présence d'une pyodermité. Mise en évidence de granulocytes neutrophiles dégénérés avec figures de phagocytose et bactéries de type coque.



## GRANDS AXES THÉRAPEUTIQUES



- Coupe courte parfois nécessaire préalablement au traitement topique
- **Application d'un shampooing antibactérien** : à base de Chlorhexidine plusieurs fois par semaine
- **Traitements antibiotiques locaux** : en cas de lésions à surface restreinte
- **Traitements antibiotiques systémiques** : antibiothérapie systémique si lésions étendues.
- **Pronostic** bon mais détermination de la cause sous-jacente nécessaire
- **⚠️** L'emploi de corticoïdes, autres immunosuppresseurs est déconseillé en cas de dermatose suppurée d'origine infectieuse.

# IMPÉTIGO



Impétigo localisé à la face ventrale du corps avec présence de pustules et croûtes punctiformes chez un chien de chasse



Multiples pustules sous cornées avec présence d'une bulle (vésicule de taille > 3 mm) en région ventrale de l'abdomen chez un chien atteint d'un syndrome de Cushing