

PYODERMITE DES JONCTIONS CUTANÉO-MUQUEUSES (PJCM)



ÉPIDÉMIOLOGIE



- Dermatose fréquente chez le chien
- **Races prédisposées** : races de chiens atopiques
- Absence de prédisposition en fonction du sexe ou de l'âge



SIGNES CLINIQUES



Topographie lésionnelle :

- Jonctions cutané-muqueuses de la face : lèvres, truffe, narines, paupières
- Autres régions : vulve, prépuce, anus
- Lésions le plus souvent bilatérales voire symétriques

Sémiologie lésionnelle et signes cliniques :

- Ulcères
- Érosions
- Fissures
- Érythème
- Tuméfaction
- Croûtes
- Hyperkératose de la truffe
- Dépigmentation focale
- Prurit variable
- Douleur variable



PATHOGÉNIE



- Infection bactérienne des jonctions cutané-muqueuses
- Dermatose évoluant dans un contexte de processus infectieux (maladie paradontale), dermatite atopique, maladie dysimmunitaire (toxidermie), maladie auto-immune (lupus cutané)



GRANDS AXES DIAGNOSTIQUES



- **Anamnèse, commémoratifs** : race prédisposée ...
- **Examen clinique**
- **Examen dermatologique**
- **Diagnostic différentiel** : maladies érosives des jonction cutané-muqueuses (lupus, pemphigoïde, pemphigus érythémateux, pemphigus vulgaire, toxidermie, leishmaniose, lymphome cutané épithélioïde, syndrome uvéo-cutané, maladies métaboliques (syndrome hépatocutané, dermatose répondant au Zinc) ...)
- **Examen cytologique** : calque réalisé en région des lésions ulcératives et érosives, mise en évidence de polynucléaires neutrophiles et bactéries de type coques ou bacilles avec images de phagocytose .
- **Examen bactériologique** : si non réponse à un traitement de première intention ou présence de bacilles
- **Réponse à l'antibiothérapie** : aide au diagnostic différentiel
- **Examen histopathologique** : dermatite lichénoïde majoritairement avec infiltrat plasmocytaire, dermatite d'interface et apoptose kératinocytaire pan épidermique incontinence pigmentaire exocytose leucocytaire



GRANDS AXES THÉRAPEUTIQUES



- **Soins topiques systématiques** : Tonte et nettoyage/antiseptie des zones atteintes
- **Antibiothérapie par voie topique**
- **Antibiothérapie par voie systémique** si nécessaire
- **Prise en charge indispensable de la cause sous-jacente**

PJCM

Atteinte de la truffe dans un contexte de PJCM : ulcérations, érosions, dépigmentation, croûtes



Lésions péri-oculaires dans un contexte de PJCM avec atteinte des paupières : lésions croûteuses, purulentes avec dépigmentation



Pyodermite des jonctions cutanéomuqueuses en région périvulvaire : infection à *Pseudomonas* chez une chienne incontinente urinaire avec une vulve barrée
Présence d'érosions et douleur

