Un cas d'hypoparathyroïdie primaire féline

Ce que peut cacher une crise convulsive...

Encadrants du service de
médecine interne du CHUVA :

Dr. Christelle Maurey
Dr. Ghita Benchekroun
Dr. Fiona Da Riz
Dr. Tristan Méric

Présenté par :

Pierre Foulex
**Assistant de recherche clinique en
cardiologie au CHUVA** (poste financé
par la fondation Un Cœur grâce à un
mécénat du laboratoire Vetoquinol)
Ancien interne de l'ENVA (CHUVA)

Anamnèse et
commémoratifs

Examen
clinique

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Signalement

- **British Longhair**
- **Femelle stérilisée de 2 ans et demi**

Motif de consultation :

2 crises épileptiques

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

Anamnèse

J0

- **Dysorexie marquée**
- **Traitements** : alimentation assistée à la seringue (pâté SPECIFIC® Intensive Support)

J3

- Première crise épileptique (≈ 5min) : décubitus latéral et perte de conscience avec **signes neurovégétatifs** (miction et mydriase) et mouvements tonico-cloniques des 4 membres, suivi par une spasticité des membres pendant 30 min → **séquençage**
- **Traitements** : injection d'anticonvulsivant par le vétérinaire traitant
- **Adipsie**

J9

- Second épisode de crise épileptique, similaire au premier
- Présentation quelques heures après au service des urgences du CHUVA

Anamnèse et
commémoratifs

Examen
clinique

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Commémoratifs

- Vit en milieu intérieur strict, sans contact avec d'autres congénères
- Statut vaccinal inconnu
- Alimentation à base de pâté Specific et de croquettes Royal Canin Kitten
- Antécédents médicaux : périodes de dysorexie pouvant durer plusieurs jours depuis son adoption

Anamnèse et
commémoratifs

**Examen
clinique**

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Examen clinique général

Muqueuses
discrètement collantes
Dsh $\approx$ 6% ; TRC = 2s

NEC : 3/9

T = 38,6 °C
Zone périnéale
souillée

FR = 32 mpm
FC = 200 mpm

Palpation abdominale
souple
Anses digestives
discrètement épaissies

Anamnèse et
commémoratifs

**Examen
clinique**

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Examen neurologique

Mydriase bilatérale
RPM gauche et droit
normaux

Vigilance
conservée

**Faiblesse
locomotrice des
postérieurs**

**Déficits proprioceptifs
des membres
postérieurs**
Réflexes spinaux
normaux

Anamnèse et
commémoratifs

**Examen
clinique**

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Examen ophtalmologique

Mydriase bilatérale
RPM gauche et droit
normaux

**Multiples opacités
ponctiformes
cristalliniennes**

Anamnèse et
commémoratifs

**Examen
clinique**

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Bilan anamnestico-clinique

Deux crises épileptiques généralisées tonico-cloniques isolées à 6 jours d'intervalle dans un contexte d'anorexie et d'adipsie, chez un chat British Longhair femelle stérilisée de 2 ans, dont l'examen clinique révèle une faiblesse musculaire et des déficits posturaux des membres postérieurs sans anomalie des réflexes, associé à une mydriase bilatérale et à de multiples opacités ponctiformes cristalliniennes.

Démarche diagnostique

- Diagnostic différentiel
- Hypothèses diagnostiques
- Examens complémentaires
- Diagnostic et synthèse

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

Origine des crises

Barnes HL. Feline Epilepsy. *Vet Clin Small Anim*, 2017

Anamnèse et
commémoratifs

Examen
clinique

**Diagnostic
différentiel**

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Hypothèses diagnostiques

1. **Hypocalcémie** 🏆
2. **Péritonite infectieuse féline**
3. **Insuffisance hépatique** (hypoglycémie, encéphalose hépatique)
4. **Épilepsie structurale**

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

Ionogramme et gaz du sang

Paramètres	Valeurs	Unité	VU
Na ⁺	144,5	mmol/L	145 - 155
K ⁺	5,42	mmol/L	3,6 - 5,5
Cl ⁻	112,8	mmol/L	105 - 115
Ca ²⁺	0,3	mmol/L	1,1 - 1,4
Lactates	1,8	mmol/L	0 - 2
pH	7,38		7,35 - 7,45
HCO ₃ ⁻	27,6	mmol/L	22 - 26
PvCO ₂	46,4	mmHg	35 - 45

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

Examen biochimique

~~Hypoglycémie~~

~~Insuffisance rénale~~

~~Signes indirects d'IH~~

Paramètres	Valeurs	Unité	VU
Glycémie	1,86	g/L	0,71 – 1,59
Créatinine	10,1	mg/L	8,0 – 24,0
Urée	0,364	g/L	0,336 – 0,756
ALAT	130	UI/L	12 - 130
PAL	54	UI/L	14 - 111
Protéines totales	77	g/L	57 - 89
Albumine	37	g/L	23 - 39
Globulines	49	g/L	28 - 51

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

Hémogramme et frottis sanguin

Paramètres	Valeurs	Unité	VU
Globules rouges	7,44	M/mm ³	6,72 – 11,39
Hémoglobine	10,1	g/ dL	9,8 – 16,9
Hématocrite	28,5	%	29 - 48
Réticulocytes	90 000	/mm ³	14 100 – 104 500
Plaquettes	410 000	/mm ³	72 000 – 457 000
Leucocytes	23 370	/mm ³	3700 – 18 660
Neutrophiles	16 826	/mm ³	1450 - 9620
Éosinophiles	1636	/mm ³	160 - 1810
Lymphocytes	3 973	/mm ³	1180 – 10 360
Monocytes	935	/mm ³	90 - 820

Frottis sanguin → présence de lymphocytes activés et d'amas plaquettaires

Ettinger SJ., Feldman EC., Côté E. *Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat.* 2017

Feldman EC., Nelson RD., Reusch C., Scott-Moncrieff C. *Canine and Feline Endocrinology.* 2015

Anamnèse et
commémoratifs

Examen
clinique

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

Exploration de l'hypocalcémie

Hypomagnésémie ?

- Dosage de la magnésémie : $Mg^{2+} = 0,44 \text{ mmol/L}$ (VU = 0,26 – 0,41)

~~Hypomagnésémie~~

Exploration de l'hypocalcémie

- Chélation du calcium ? Diminution sécrétion PTH ?
 - Dosage de la phosphatémie : $\text{PO}_4^{3-} = 89 \text{ mg/L}$ (VU = 32 – 78)

Exploration de l'hypocalcémie

Hypoparathyroïdie ?

- **Dosage de la PTH sérique : PTH < 20 mg/L (VU = 50 – 100)**
(Dosage réalisé à VetAgrosup)

~~Pseudohypoparathyroïdie~~

Exploration de l'hypocalcémie

Hypoparathyroïdie ?

- **Dosage de la PTH sérique : PTH < 20 mg/L (VU = 50 – 100)**

(Dosage réalisé à VetAgrosup)

- Crises épileptiques
- Hypocalcémie ionisée
- Diminution [PTH]_{sérique}
- Absence de thyroïdectomie
- Diagnostic d'exclusion

**Hypoparathyroïdie
Primaire**

Synthèse

Crises épileptiques réactives d'origine métabolique associées à une faiblesse musculaire dues à une hypocalcémie marquée secondaire à une hypoparathyroïdie primaire chez un chat British Longhair femelle stérilisée de 2 ans compliquées d'une cataracte immature hypocalcémique.

Traitements et suivi

Évolution de la calcémie ionisée et de la phosphorémie

- ① **Glu de Ca²⁺** Boli à 0,5 ml/kg IV lente
- ② **Glu de Ca²⁺** Bolus à 0,5 ml/kg en IV lente puis CRI à 1,3 mg/kg/h
- ③ **Glu de Ca²⁺ : CRI à 0,91 mg/kg/h puis 0,65 mg/kg/h**
Carb de Ca²⁺ : (CALTRATE ND) : 600 mg/j
- ④ CRI de **Glu de Ca²⁺** 0,65 mg/kg/h
Alfacalcidol (dérivé de la vit D) : **0,12 µg/kg**
Carb de Ca²⁺ : (CALTRATE ND) : 600 mg/j
- ⑤ **Alfacalcidol** (dérivé de la vit D) : 0,12 µg/kg
Carb de Ca²⁺ : (CALTRATE ND) : 900 mg/j
- ⑥ **Alfacalcidol** (dérivé de la vit D) : **0,1 µg/kg (1 goutte/j)**
Carb de Ca²⁺ : (CALTRATE ND) : 900 mg/j
- ⑥ **Reprise progressive de l'appétit et stabilisation de la calcémie → sortie d'hospitalisation**
- ⑦ Contrôle à J14 : amélioration de l'hypocalcémie mais hyperphosphorémie toujours marquée
Très bon état général. Diminution du Carb de Ca²⁺ de 15%
- ⑧ Contrôle à J22 : stabilisation de la calcémie mais hyperphosphorémie toujours marquée
Très bon état général. Diminution du Carb de Ca²⁺ de 50%
Transition vers une alimentation rénale
- ⑨ Contrôle à J37 : **calcémie et phosphorémie normalisées**
Arrêt du Carb de Ca²⁺. Poursuite de l'Alfacalcidol et de l'alimentation rénale

Discussion

Anamnèse et
commémoratifs

Examen
clinique

Diagnostic
différentiel

Examens
complémentaires

Diagnostic

Traitements et
évolution

Discussion

- 1. La gravité de l'hypocalcémie pouvait-elle nous orienter sur le diagnostic ?**
- 2. Quel pronostic à long terme peut-on espérer dans notre cas ?**

Hypoparathyroïdie primaire chez le chat

Infiltration par des lymphocytes, fibroblastes et néovascularisation

1. La gravité de l'hypocalcémie pouvait-elle nous orienter sur le diagnostic ?

Severity of Ionized Hypercalcemia and Hypocalcemia Is Associated With Etiology in Dogs and Cats

Michelle Coady, Daniel J. Fletcher and Robert Goggs*

Department of Clinical Sciences, Cornell University College of Veterinary Medicine, Ithaca, NY, United States

- 15 277 chiens et 3715 chats présentés entre 2007 et 2017
- Hypocalcémie ionisée chez 1467 chiens (10%) et 450 chats (12%)

	Maladies	(%)	Maladies	(%)
1. Insuffisance rénale		21,6	1. SIRS/SEPSIS	17,4
2. ABAU obstructive		15,1	2. Insuffisance rénale	10,4
3. SIRS/SEPSIS		14,7	3. Intoxication	7,5

Étiologies responsables d'hypocalcémie chez le chat et le chien

1. La gravité de l'hypocalcémie pouvait-elle nous orienter sur le diagnostic ?

TABLE 2 | Conditions associated with hypocalcemia.

Cause	Dogs			Cats		
	Mild n (%)	Moderate-severe n (%)	All n (%)	Mild n (%)	Moderate-severe n (%)	All n (%)
Non-pathologic, transient or inconsequential	627 ^a (49.8)	19 ^b (9.2)	646 (44.0)	87 ^a (40.1)	22 ^b (9.4)	109 (24.3)
Parathyroid related	7 ^a (0.6)	4 ^b (1.9)	11 (0.7)	2 ^a (0.9)	0 ^a (0.0)	2 (0.4)
Kidney injury	99 ^a (7.9)	53 ^b (25.6)	152 (10.4)	36 ^a (16.6)	61 ^b (26.2)	97 (21.6)
Acute pancreatitis	43 ^a (3.4)	8 ^a (3.9)	51 (3.5)	5 ^a (2.3)	6 ^a (2.6)	11 (2.4)
Nutritional or gastrointestinal	77 ^a (6.1)	16 ^a (7.7)	93 (6.3)	6 ^a (2.8)	5 ^a (2.1)	11 (2.4)
Eclampsia	23 ^a (1.8)	15 ^b (7.2)	38 (2.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Toxicity	95 ^a (7.5)	15 ^a (7.2)	110 (7.5)	20 ^a (9.2)	18 ^a (7.7)	38 (8.4)
Critical illness	206 ^a (16.3)	49 ^b (23.7)	255 (17.4)	25 ^a (11.5)	41 ^a (17.6)	66 (14.7)
Diabetes mellitus	54 ^a (4.3)	10 ^a (4.8)	64 (4.4)	15 ^a (6.9)	14 ^a (6.0)	29 (6.4)
Soft tissue trauma	14 ^a (1.1)	0 ^a (0.0)	14 (1.0)	1 ^a (0.5)	7 ^b (3.0)	8 (1.8)
Urethral obstruction	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 ^a (8.8)	49 ^b (21.0)	68 (15.1)
Undetermined	15 ^a (1.2)	18 ^b (8.7)	33 (2.2)	1 ^a (0.5)	10 ^b (4.3)	11 (2.4)
All causes	1,260 (85.9)	207 (14.1)	1,467 (100)	217 (48.2)	233 (51.8)	450 (100)

- Hypocalcémie **discrète** (1,00 mmol/L < [iCa] < 1,06 mmol/L) :
 - Hypocalcémie transitoire ou non reliée à une affection
 - Pancréatite
 - Diabète sucré
- Hypocalcémie **modérée à grave** ([iCa] < 1,00 mmol/L)
 - Insuffisance rénale
 - Traumatisme des tissus mous
 - ABAU obstructive
- Gravité de l'hypocalcémie variable :
 - Hypocalcémie d'origine intestinale
 - Intoxication

2 chats atteints d'hypoparathyroïdie II iatrogène

Discrète hypocalcémie

in Veterinary Science

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

1. La gravité de l'hypocalcémie pouvait-elle nous orienter sur le diagnostic ?

Serum Calcium (mg/dl)

8.2-11.2

4.1

4.2

2.8

4.0

3.9

Idiopathic Hypoparathyroidism in Five Cats

Mark E. Peterson, DVM, Katherine M. James, DVM, Melissa Wallace, DVM, Steven D. Timothy, DVM, and Richard J. Joseph, DVM

- Tous les chats présentés avec des signes cliniques généraux et neurologiques
- Hypocalcémie totale marquée et hyperphosphatémie pour tous les chats

- 16 chats atteints d'hypoparathyroïdie primaire rapportés dans la littérature vétérinaire (âge moyen : 2,5 ans)
- Hypocalcémie marquée et **hyperphosphatémie** pour tous les chats
- (tCa_{moyen} = 4,0 mg/dL)

Hypoparathyroïdie I

Hypocalcémie majeure

2. Quel pronostic à long terme peut-on espérer dans notre cas ?

Idiopathic Hypoparathyroidism in Five Cats

Mark E. Peterson, DVM, Katherine M. James, DVM, Melissa Wallace, DVM, Steven D. Timothy, DVM, and Richard J. Joseph, DVM

- 4/5 chats avec HyperCa²⁺ lors du suivi
- Supplémentation en Ca²⁺ à long terme nécessaire pour 3 chats
- **1** chat décédé **28mois** après le diagnostic d'un hémangiosarcome métastasé
- **4** chats **toujours en vie** à 5, 15, 29 et 37 mois post-diagnostic (médiane = 21,5 mois)

- 7 chats atteints d'hypoparathyroïdie I rapportés à l'UC Davis
- Le pronostic à long terme semble excellent si :
 - ✓ $0,9 < iCa^{2+} < 1,1$ (mmol/L)
 - ✓ Suivi après hospitalisation :
 - ✓ 2 fois la première semaine
 - ✓ 1 fois par semaine pendant 3 semaines
 - ✓ 1 fois par mois pendant 3 mois
 - ✓ 1 fois tous les 2 à 3 mois

- Un chat atteint d'hypoparathyroïdie I confirmée
- Développement d'une mycardiopathie hypocalcémique congestive → Insuffisance cardiaque congestive
- Traité avec du furosémide, pimobendane, énalapril, calcitriol et sels de calcium
- **Récupération de la fonction cardiaque en 1 mois**
- **Toujours en vie après 399j avec comme seul traitement du calcitriol**

Anamnèse et commémoratifs

Examen clinique

Diagnostic différentiel

Examens complémentaires

Diagnostic

Traitements et évolution

Discussion

2. Quel pronostic à long terme peut-on espérer dans notre cas ?

Merci pour votre attention

Pierre Foulex

Remerciements aux services suivants pour leur aide précieuse dans la prise en charge de ce cas :

- ✓ Urgences/Soins-Intensifs
- ✓ Ophtalmologie
- ✓ Imagerie

Bibliographie

- BARNES HELLER H. Feline Epilepsy. *Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract.*. 2018, **48**, 31-43.
- CLARKE BL., BROWN EM., COLLINS MT., JÜPPNER H., LAKATOS P., LEVINE MA., et al. Epidemiology and Diagnosis of Hypoparathyroidism. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*. 2016, **101**, 2284-2299.
- COADY M., FLETCHER DJ., GOGGS R. Severity of Ionized Hypercalcemia and Hypocalcemia Is Associated With Etiology in Dogs and Cats. *Front Vet Sci.* 2019, **6**, 276.
- DE BRITO GALVÃO JF., SCHENCK PA., CHEW DJ. A Quick Reference on Hypocalcemia. *Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract.*. 2017, **47**, 249-256.
- DIAS C., CARREIRA LM. Serum ionised calcium as a prognostic risk factor in the clinical course of pancreatitis in cats. *J. Feline Med. Surg.*. 2015a, **17**, 984-990.
- ETTINGER SJ., FELDMAN EC., CÔTÉ E. *Textbook of veterinary internal medicine: diseases of the dog and the cat.* 2017,.
- FABRÈS V., DOSSIN O., REIF C., CAMPOS M., FREICHE V., MAUREY C., et al. Development and validation of a novel clinical scoring system for short-term prediction of death in dogs with acute pancreatitis. *J. Vet. Intern. Med.*. 2019, **33**, 499-507.
- FELDMAN EC., NELSON RD., REUSCH C., SCOTT-MONCRIEFF C. *Canine and Feline Endocrinology.* 2015
- HAMADA A., KONDOH T., KAMEI T., TOMINAGA N., TSURU A., MATSUMOTO T., et al. Protein-losing enteropathy complicated with recurrent convulsions and developmental delay in a 4-month-old boy. *Pediatr Int.* 2002, **44**, 686-689.
- HOLOWAYCHUK MK. Hypocalcemia of critical illness in dogs and cats. *Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract.*. 2013, **43**, 1299-1317, vi-vii.

Bibliographie

- HOLOWAYCHUK MK., MONTEITH G. Ionized hypocalcemia as a prognostic indicator in dogs following trauma. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)*. 2011, **21**, 521-530.
- JAFFEY J., DECLUE A., CANNON A., TOCCI L., HYLAND J. Presumptive Glucocorticoid-Induced Refractory Hypocalcemia in a Dog with Idiopathic Immune-Mediated Hypoparathyroidism, Thrombocytopenia, and Hemolytic Anemia. *J Am Anim Hosp Assoc*. 2019, **55**, e55104.
- KELLETT-GREGORY LM., MITTLEMAN BOLLER E., BROWN DC., SILVERSTEIN DC. Ionized calcium concentrations in cats with septic peritonitis: 55 cases (1990-2008). *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio)*. 2010, **20**, 398-405.
- LIE AR., MACDONALD KA. Reversible myocardial failure in a cat with primary hypoparathyroidism. *J. Feline Med. Surg.*. 2013, **15**, 932-940.
- NIVY R., KAPLANOV A., KUZI S., MAZAKI-TOVI M., YAS E., SEGEV G., et al. A retrospective study of 157 hospitalized cats with pancreatitis in a tertiary care center: Clinical, imaging and laboratory findings, potential prognostic markers and outcome. *J. Vet. Intern. Med.*. 2018, **32**, 1874-1885.
- PETERSON ME., JAMES KM., WALLACE M., TIMOTHY SD., JOSEPH RJ. Idiopathic hypoparathyroidism in five cats. *J. Vet. Intern. Med.*. 1991, **5**, 47-51.
- RUSSELL NJ., BOND KA., ROBERTSON ID., PARRY BW., IRWIN PJ. Primary hypoparathyroidism in dogs: a retrospective study of 17 cases. *Aust. Vet. J.*. 2006, **84**, 285-290.
- TESHIMA T., KURITA S., SASAKI T., MATSUMOTO H., NIINA A., ABE D., et al. A genetic variant of CYP2R1 identified in a cat with type 1B vitamin D-dependent rickets: a case report. *BMC Vet. Res.*. 2019, **15**, 62.
- VAN BIERVLIET S., VELDE SV., ROBBERECHT E., VAN WINCKEL M. Hypocalcaemic seizures: sign of intestinal disease?. *Acta Gastroenterol. Belg.*. 2007, **70**, 243-244.
- WHITEHEAD J., QUIMBY J., BAYLISS D. Seizures Associated With Hypocalcemia in a Yorkshire Terrier With Protein-Losing Enteropathy. *J Am Anim Hosp Assoc*. 2015, **51**, 380-384.